

La Trampa del SIDA



LEE LA LETRA CHICA:

NOTA EN EL TEST RÁPIDO: "Indicado para ser usado como test en el ámbito hospitalario para facilitar el diagnóstico de la infección con el VIH-1." "Un test reactivo... **sugiere** la presencia de anticuerpos..." (En otras palabras, no es en realidad el "test del VIH.")

NOTA EN EL TEST DE ANTICUERPOS ELISA:

"En la actualidad **no existe un criterio reconocido** que permita establecer la presencia o la ausencia de anticuerpos VIH-1 en la sangre humana."

NOTA DE CONFIRMACIÓN EN EL TEST WESTERN BLOT:

"Los resultados positivos en la prueba inmunoquímica, cualquiera sea el tipo de muestra, deberán ser seguidos con **tests complementarios.**"

NOTA EN EL TEST GENÉTICO RCP (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA):

"No está indicado para ser utilizado como prueba de detección del VIH o como test de diagnóstico para confirmar la infección con el VIH." (¿Este test **no está indicado** para confirmar la presencia del virus?)

NOTA EN EL TEST GENÉTICO DE bDNA:

"No está indicado para ser usado como prueba de detección de la infección con el VIH o como test de diagnóstico que confirma el diagnóstico de infección con el VIH." (¿Este test **no está indicado** para confirmar la presencia del virus?)

ES INCREÍBLE, pero estos tests no están indicados para buscar o encontrar el VIH, aun así los médicos los usan para decirle a la gente que está "infectada" con el VIH, ¡y que tienen, o pronto tendrán, el SIDA!



¿QUÉ PONEN EN CONSIDERACIÓN LOS VIRÓLOGOS PARA LLAMARLO EL "VIH"?

A mediados de la década del 80, el Dr. Robert Gallo encontró proteínas en la sangre de víctimas del SIDA que supuso eran parte de un virus que estaba causando el SIDA. Gallo y sus colaboradores inventaron un test basado en esas proteínas. Si los tests se tornaban – arbitrariamente– de un color determinado, se consideraba que eras VIH positivo.

¿PERO "POSITIVO" EN BASE A QUÉ?

Las proteínas análogas que los tests detectan son a veces encontradas en mujeres que están o estuvieron embarazadas, o personas que han recibido ciertas vacunas (tales como la de la gripe, la hepatitis B o el tétanos), o aquellos que han tenido transfusiones de sangre o usado drogas callejeras en forma crónica, o los que tuvieron infecciones fúngicas o infecciones virales tales como el herpes, la varicela o el sarampión. Todos estos factores (y muchos otros, alrededor de 70 en total) pueden hacer que un test dé un resultado positivo. En algunos casos y sin ninguna razón aparente, el test les da positivo a las personas que gozan de buena salud.

Si el test te da positivo, deberías preguntarte por qué. ¿Es porque estuviste embarazada, o recibiste la vacuna de la gripe, o algunos de los otros 70 factores o condiciones que pueden hacer que te dé positivo, y que no son enfermedades que constituyen una amenaza para la vida? ¿O tu sistema inmune está comprometido, y necesitas saber por qué y qué hacer al respecto? ¿O el resultado no tiene ningún significado en absoluto?

EI TEST DE "CARGA VIRAL" RCP

Una técnica llamada RCP –reacción en cadena de la polimerasa– encuentra y multiplica fragmentos específicos y minúsculos de código genético que pueden identificar un virus. Sin embargo, por el hecho de que existan fragmentos específicos del ARN, ¿significa necesariamente que el virus se encuentra presente? Los investigadores jamás pudieron encontrarlos cuando usaron el microscopio electrónico con la tecnología RCP para buscar los retrovirus del VIH en la sangre de los pacientes con SIDA, quienes tenían lo que se denominaban altas cargas virales.

(LAS FOTOS Y DIBUJOS QUE ENCUENTRAS EN LA LITERATURA DEL VIH Y EL SIDA SON TODAS PARTÍCULAS DE ORIGEN Y FUNCIÓN DESCONOCIDOS QUE PUEDEN SER INDUCIDAS EN PLACAS DE PETRI. NO SE PUEDEN ENCONTRAR LAS IMÁGENES DE PARTÍCULAS DE RETROVIRUS INTACTO EN SANGRE FRESCA DE GENTE CON SIDA CON USO DEL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO).



¿LOS VIRÓLOGOS LE TENDIERON UNA TRAMPA A LAS INOCENTES CADENAS DE ARN SOLO POR ESTAR EN LA ESCENA DEL CRIMEN?

El código genético denominado llamado VIH puede variar hasta en un 20% de una persona a otra persona como para denominarlo muestra. Hasta hay informes que las secuencias del VIH han sido detectadas en humanos, ratones, perros, ganado, y hasta en moscas y gusanos normales no infectados con el VIH.

Los virólogos dicen que estos genomas del VIH matan las células inmunes CD4, pero no pueden hallar esos confusos marcadores que creen que identifican el VIH en suficientes células CD4 para hacerles serios daños. ¿Es posible que las células puedan formar estas cadenas en respuesta a una enfermedad como un mecanismo de defensa? ¿Están allí para defender en vez de atacar? ¿O quizá sean un derivado de una enfermedad?

EXISTEN MÁS PROBLEMAS CON LA TEORÍA DEL VIH/SIDA

Los científicos gastan billones de dólares en más de 60 diferentes pruebas de vacunas pero ninguna ha producido una verdadera seroconversión de los anticuerpos de proteínas que diagnostican a la gente con el VIH mediante el uso de los tests del VIH, ni mencionar la protección contra el contagio del VIH. Solo un test –aunque cuestionable– ha reducido mínimamente el número de personas a las que el test les dio VIH positivo. ¿Podrían estas fallas ser indicativas de que no existen retrovirus específicos inherentes al SIDA?

Las predicciones del SIDA como una pandemia en los años 90 nunca se materializaron. No es un dato que se divulgue, pero la pandemia del SIDA nunca ocurrió en África, donde la población se ha duplicado desde que comenzó el SIDA. Las estadísticas en ese continente son seriamente erróneas. Si alguien muere de tuberculosis, u otras causas comunes, pueden decir que murió por el SIDA como excusa para atraer más caridad y fondos del gobierno con el fin de obtener medicamentos.

El SIDA no es ni siquiera lo mismo en todos lados. La mayoría de los casos diagnosticados como SIDA en los Estados Unidos involucra a gente que goza de buena salud mediante un test VIH positivo y el bajo conteo de células inmunes CD4. En África no se necesita siquiera el test del VIH conforme a la definición de Bangui de la Organización Mundial de la Salud. Solamente fiebre, tos, pérdida de peso, diarrea u otros síntomas genéricos de la enfermedad, malnutrición o infecciones parasitarias son suficientes para el diagnóstico del SIDA.

La Trampa del SIDA

SI PIENSAS QUE PUEDES SER VIH POSITIVO

...estás en peligro de caer en la trampa del SIDA. Si el test del VIH te da positivo te dirán que tienes una enfermedad mortal. Te tirarán en la "zona del SIDA", como si estuvieras en una película hipnótica cuyas consecuencias están predestinadas. ¡Debes intentar escapar!

Es posible que te digan que tomes medicamentos antiretrovirales de inmediato. ¡Cuidado! ¿Por qué dio positivo tu test? ¿Alguno de los 70 factores mencionados anteriormente que pueden causar un resultado positivo se relacionan contigo? ¿Necesitas que te traten frente a una enfermedad seria o toxicidad? Quizá un estilo de vida más saludable es lo que necesites. O quizá goces de un perfecto estado de salud.

En algunos casos, tales como las infecciones fúngicas o bacterianas, los ARV –antiretrovirales– pueden traer alivio en un corto plazo, no porque afectan a los virus sino porque sucede que matan hongos y bacterias (y también matan las mitocondrias de las células que son esenciales para tu vida). A largo plazo, el uso de ARV es nocivo –la principal causa de muerte para los pacientes que toman medicamentos para el SIDA es la insuficiencia hepática, un efecto colateral conocido de esta medicina–.

Las drogas para el SIDA pueden además causar serios cambios en la forma de tu cuerpo tales como la pérdida de grasa de tu cara y piernas hasta formar una joroba de búfalo en tu espalda. Se ha encontrado una creciente incidencia de ataques cardíacos, y la anemia que pone en riesgo la vida es común en alrededor de la mitad de las personas que toman antiretrovirales. Muchas de estas medicaciones están asociadas con insuficiencias renales y trastornos nerviosos tan severos que los enfermos ni siquiera pueden escribir sus nombres o caminar.

Si estás embarazada te presionarán para que tomes medicamentos que interferirán con el crecimiento de tu bebé causando posiblemente defectos de nacimiento o cánceres. Las autoridades te amenazarán con quitarte a tu hijo si tratas de amamantarlo o te rehúsan a darle medicamentos similares.

Si eres sexualmente activo podrías ser sentenciado a años de cárcel si tu pareja –que consintió tener sexo contigo– presenta una denuncia a la policía de que no sabía que eras VIH positivo.

¡TODO ESTO PORQUE TE HAS HECHO EL TEST DEL VIH!

La Trampa del SIDA

NO PIERDAS LA VIDA CON LA HISTERIA DEL SIDA

Los médicos que tratan el SIDA mataron accidentalmente cerca de 300.000 personas durante la histeria del SIDA entre los años 1987-1997 (con la prescripción de altas dosis de AZT o drogas similares). Fue una masacre colectiva iatrogénica (causada por los médicos) que se llevó las vidas de Arthur Ashe, Rudolph Nureyev, Keith Haring, Kimberly Bergalis y Freddie Mercury, entre tantos otros.

Ellos gozaban de buena salud hasta que se los convenció de que tomaran medicamentos. Este peligro sigue aun con nosotros. Los medicamentos modernos para el SIDA son menos tóxicos, pero todavía siguen poniendo en riesgo la vida, solo que no a corto plazo. En la actualidad, 2009, aquellos que están con modernas terapias de ARV –antiretrovirales– se están muriendo a la edad promedio de 45 años.

LAS MISMAS MEDICINAS PARA EL SIDA PUEDEN CAUSAR LOS SÍNTOMAS DEL SIDA.

Se les administra con frecuencia las drogas para el SIDA a aquellos cuyo test del HIV les da positivo, pero que gozan de buena salud y no tienen síntomas. Una vez que estás tomando la medicación, puedes experimentar pérdida de peso, náuseas, diarrea, confusión mental, insuficiencia de órganos, etc. Los médicos dicen: "Es el VIH que ataca no solo el sistema inmunológico sino también el cerebro y el sistema nervioso. En consecuencia, has contraído el SIDA."

EL CASO DE JIM MALONE

Lo que los médicos le dicen a las personas cuyo test del VIH les da positivo causa con frecuencia un severo trauma. De hecho, solo el terror y la desesperación son a menudo suficientes para enfermarlos. Jim Malone de San Francisco es solo uno de los ejemplos:

En 1986 se le informó a Jim que su test del VIH había dado positivo, y por tanto estaba infectado con el VIH. Casi de inmediato, perdió el apetito y la capacidad de sueño, y durante los ocho años siguientes perdió el 20% de su peso normal. Se enfermó cada vez más hasta que finalmente necesitó la asistencia de una enfermera domiciliaria. En 2003 le dijeron que tenía SIDA terminal. Luego en el 2004 se hizo otro test, y se enteró de que su test del VIH era negativo. De inmediato, todos los problemas de salud y de sueño comenzaron a desaparecer. En la actualidad Jim anda bien.

CAUSAS Y TRATAMIENTOS PARA EL "SIDA"

Frecuentemente se afirma que hay un gran cuerpo de estudios investigativos que muestra que el SIDA es causado por el VIH. Sin embargo, la repetición constante no hace que una falacia sea verdad. Pídele a cualquier experto o virólogo que proporcione referencias científicas que lo demuestren, ¡y te encontrarás con que no pueden! Es interesante que jamás se haya documentado en una publicación evaluada por profesionales del mismo rango que algún trabajador de la salud haya contraído SIDA cuando se pinchara accidentalmente con sangre infectada con el VIH. Esto ocurriría con frecuencia si el SIDA causara la infección.

Tu sistema inmunológico se puede dañar por causa de la malnutrición, el estrés, las drogas o los medicamentos tóxicos, o hasta por una transfusión de sangre. Estas consecuencias pueden causar un estado de estrés oxidativo con demasiados "radicales libres" nocivos. Esta condición además puede producir que el test del VIH dé positivo.

Si te dijeron que tienes una enfermedad indicadora del SIDA, puedes exigir un tratamiento específico para esa enfermedad, y no tienes que aceptar un tratamiento de antiretrovirales, además de tener que pelear contra un virus imaginario que no fue probado científicamente y que te dirán que está en tu sangre sin demostrarlo.

TU ENFERMEDAD EXISTE DESDE ANTES QUE SE INVENTARA EL SIDA.

Tu sistema inmunológico puede ser restaurado mediante enfoques tales como el de los suplementos antioxidantes, evitando demasiado estrés, o eliminando la exposición a las toxinas o químicos potentes (incluyendo las drogas).

No es posible que contraigas SIDA por medio del sexo; sin embargo, las enfermedades venéreas no tratadas pueden comprometer tu sistema inmunológico.

La idea de que el SIDA pueda ser transmitido por el VIH a través del sexo a cualquiera y a todos es incorrecta. Las prostitutas no están en riesgo de contraer el SIDA al menos que sean tóxico dependientes. Las personas que son VIH negativo raramente se convierten en VIH positivo después de tener sexo sin protección con sus parejas que tienen el VIH positivo.

ESTAR VIVO... Y BIEN

Lo cierto es que a miles de personas les han dado positivos los tests del HIV, pero eligieron su tratamiento sobre la base de sus síntomas sin tomar drogas para el SIDA. Andan bien por 10, 15 y más de 20 años después. Billones de dólares en investigación no nos han dado ni una vacuna ni una cura. Miles de médicos, científicos, periodistas, expertos legales y educadores ahora creen que la teoría de que el VIH causa el SIDA debe ser re-examinada. Muchos han afirmado que la teoría del VIH-SIDA, y no el SIDA mismo, es la tragedia más grande del último siglo. Para más información y referencias que respaldan esta información aquí, o para ver una lista de los miles de profesionales en el mundo que cuestionan las actuales creencias del VIH, visite el sitio web de **Rethinking AIDS**: www.rethinkingaids.com

¿CÓMO PUEDE SER QUE TANTOS DOCTORES Y EXPERTOS ESTÉN EQUIVOCADOS?

Cuando comenzó el SIDA hubo miedo y una tremenda presión por una respuesta. Con nuestro entorno cultural puritano (el sexo es malo y maléfico), fácilmente se aceptó la teoría de que el SIDA podía ser propagado a todos mediante el sexo. Con dinero se crearon un ímpetu para la investigación y los medicamentos para el VIH.

Para el momento cuando la teoría del VIH se puso en tela de juicio, los profesionales médicos y científicos habían llegado a un consenso prematuro con la declaración de que el SIDA era la causa del VIH.

Muchos trabajadores en la industria del SIDA tenían sus carreras comprometidas con este supuesto que debía demostrarse. No podían ver el error, o si lo veían, no podían luchar contra esta afianzada creencia y las políticas de salud pública.

Se forzó a los expertos del SIDA a seguir extendiendo las expectativas de vida a los que son VIH positivo en el caso de que no tomen los medicamentos para el SIDA. Han pasado 20 años – ¡casi la duración entera de la epidemia!

¿POR QUÉ SE MANTIENE VIVA LA INCORRECTA TEORÍA DEL SIDA?

Hay un estridente grupo del gobierno y activistas financiados por la industria farmacéutica llamados *AIDS Truth* (La Verdad sobre el SIDA) que afirman que cualquiera que se oponga al dogma VIH=SIDA "vive en un manto de negación". Dicen que nuestra información crítica e inquisitiva es "peligrosa y una amenaza para la salud pública."

Desafortunadamente, los médicos, científicos y periodistas son despiadadamente atacados y aislados cada vez que señalan la inexactitud de los tests del VIH, la ineffectividad y el peligro de los medicamentos para el SIDA, y la falta de evidencia científica de que las partículas rotuladas bajo el nombre del VIH causan el SIDA.

Involucrarse podría costarles el respeto de sus colegas, sus carreras, posición social e ingresos. Todos los científicos castigados de esta manera asustan a muchos otros para que acaten lo que se les exige.

Los científicos y principalmente los médicos se encierran con frecuencia en sus capullos de conocimiento: es posible que prefieran depender de la información proveniente de las autoridades y no investigar el tema por sí mismos.

ESTE FOLLETO HA SIDO APROBADO POR EL CONSEJO DE RETHINKING AIDS, LA ASOCIACIÓN A FAVOR DE LA REEVALUACIÓN CIENTÍFICA DE LA HIPÓTESIS DEL VIH/SIDA.

La Trampa del SIDA



UN RESULTADO POSITIVO DEL TEST DEL VIH CAMBIARÁ TU VIDA PARA SIEMPRE. PODRÍAS PERDER TUS AMIGOS, TUS RELACIONES, TU SEGURO DE SALUD, TU TRABAJO, LA CUSTODIA DE TUS HIJOS, Y HASTA TU CORDURA. Nos gustaría que conozcas algunos hechos antes de que estés de acuerdo en hacerte lo que se llama el test del VIH; hechos que los médicos y el personal clínico no te dirán. Un resultado positivo no significa que estás infectado con un virus mortal. Puede ser causado por factores que no ponen en riesgo tu salud, aunque puede ser un aviso de que tu sistema inmunológico está deteriorado. Si estás enfermo puede que no necesites medicamentos para mejorarte; particularmente, que no necesites los medicamentos para el SIDA.

