

Nujol - Indications, Posologie, Contre indications, Effets indésirables

Source RESIP-BCB

NUJOL Solution buvable Flacon de 480 ml

Classe thérapeutique : [Gastro-Entéro-Hépatologie](#)

Principes actifs : Paraffine

Statut : Conditionnement modifié ou retiré de la vente depuis le 02/09/2004

Laboratoire : [Fumouze](#)



Sommaire

- [Indications](#)
- [Posologie](#)
- [Contre indications](#)
- [Effets indésirables](#)
- [Précautions et autres informations](#)

Indications

Traitement symptomatique de la constipation.

Posologie

- Adulte : 1 à 2 cuillères à soupe par jour.
- Enfant de plus de 6 ans : 2 à 3 cuillères à café par jour.

Prendre de préférence le matin à jeun. En cas de prise le soir, il faut recommander au malade de ne pas s'aliter dans les 2 heures qui suivent la prise (voir mises en garde et précautions d'emploi) et de tenir compte du délai d'action (6 à 8 heures).

Contre indications

- Syndrome occlusif ou subocclusif.
- Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée.

Effets indésirables

Risque de suintement anal et parfois d'irritation péri-anale.

▶ [Nujol : Précautions, Comment ça marche, Interactions](#) ▶

Voir aussi les maladies liées à Nujol...



[La constipation](#)

La constipation est assez souvent due à un ralentissement du..

[Lire la suite](#)

NUJOL Solution buvable Flacon de 480 ml

Classe thérapeutique : [Gastro-Entéro-Hépatologie](#)

Principes actifs : Paraffine

Statut : Conditionnement modifié ou retiré de la vente depuis le 02/09/2004

Laboratoire : [Fumouze](#)



Sommaire

- [Précautions](#)
- [Interactions](#)
- [Comment ça marche](#)
- [Retour aux indications](#)

Précautions d'emploi

MISES EN GARDE :

- L'utilisation prolongée d'un laxatif est déconseillée.
- Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique :
 - . enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons,
 - . conseil d'activité physique et de rééducation de l'exonération.
- Chez l'enfant, la prescription des laxatifs doit être exceptionnelle ; elle doit prendre en compte le risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- L'utilisation prolongée de paraffine liquide est susceptible de réduire l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K).

- L'administration de paraffine liquide chez les jeunes enfants, les personnes débilitées, allongées, ou ayant des difficultés de déglutition, doit être prudente en raison du risque d'inhalation bronchique et de pneumopathie lipoïde.

Interactions avec d'autres médicaments

Comment ça marche ?

La paraffine liquide n'est pas absorbée.

▶ [Nujol : Indications, Posologie, Contre indications, Effets indésirables](#) ▶
